

Применение Спартана + Каолин для исключения ржавчины (крапчатости) и солнечного ожога на яблоне

(фирма „Апфелино / Apfelino“, В.Шифермюллер, г.Мистельбах, Австрия /
W. Schiefermüller, Mistelbach, Österreich)

1. Спартан + Каолин против ржавчины (крапчатости)



2 – 3 раза после цветения, первая обработка после опадения плодов в июне в фазе лесного ореха яблони

Спартан 0,02 % + Каолин 5,0 кг/га на 250 л воды/га

После первой обработки последующие обработки с интервалом 7 дней (неделя).

Опрыскивания против ржавчины (крапчатости) Спартаном + Каолин возможны в комбинации при внесении фунгицидов, инсектицидов, росторегуляторов и т.д.

2. Спартан + Каолин против солнечного ожога



С началом интенсивного солнечного освещения требуются следующие обработки:

Спартан 0,02% + Каолин 7,5 кг/га

Опрыскивания против солнечного ожога Спартаном + Каолин могут быть в комбинации при внесении фунгицидов, инсектицидов и т.д.

При истончении поверхности плодов требуется повторять обработки.

Расход рабочей жидкости не менее 500 л/га.

Для наиболее оптимального покрытия плодов в практике оправдал себя способ реверсивного/ двустороннего движения агрегата, т.е. туда-сюда.

